

علاوه بر فیستول، آبسه درمان نشده

خطر ابتلا به عفونت سیستمیک را

افزایش می‌دهد. در حدود ۵۰٪ از موارد

آبسه به فیستول می‌اجامد

از انجائیکه فیستول‌ها خودبخود بھبود

نمی‌یابند معمولاً درمان جراحی

پیشنهاد می‌شود

* درمان

درمان اصلی ان فیستولکتومی می‌باشد

قسمت تحتانی روده با چندین نوبت انما

تخلیه و تمیز می‌شود با ایجاد برش از

ناحیه رکتال به سمت بیرون فیستول باز

یافته و می‌تواند رکتال را به پوست

متصل کند

همچنین ممکن است نتیجه ضربه یا

تروما و شقاق (فیشر) بوده یا در اثر

بیماری کرون ایجاد شود ممکن است

از خلال منفذ پوستی ایجاد شده

چرک یا مدفوع نشت پیدا کند سایر

نشانه‌ها ممکن است بسته به محل

فیستول بصورت گاز یا مدفوع از واژن

یا مثانه باشد فیستول‌های درمان

نشده می‌توانند موجب عفونت شوند

فیستول آنال یک مجرای باریک لوله

ای و فیبروزه است که از یک منفذ

بازشده در کنار آنال به داخل کanal

مقعدی گسترش می‌باید فیستول

معمولًا به دنبال آبسه مقعدی ظاهر

می‌شود

. در واقع می‌توان گفت اگر نسبت به

درمان آبسه بی‌تفاوت عمل شود و

فرآیند درمان کامل نشود احتمال


تبديل آبسه به فیستول وجود دارد،

چرا که در این حالت عفونت گسترش

بیمارستان ۳۱ خرداد منجیل

سحر محمدی
کارشناس پرستاری

فیستول آنال



منبع: بروونر - سودارت ۲۰۱۸ - ویرایش ۱۴ - داخلی

جراحی بخش سیستم گوارش

تنظیم: واحد اموزش سلامت

میشود زخم ناحیه عمل پانسمان

شده و داروهایی مانند مسكن و انتی

بیوپتیک تجویز میشود در نیمی از

بیماران ممکن است فیستول عود

کرده و مجدداً ایجاد شود
